

Enfamil Premium 2 MFGM, mleko modyfikowane 800g Data ważności październik 2024r.



Cena: 15,99 zł

Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MEAD JOHNSON
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Środki spożywcze / żywność wzbogacona

Opis produktu

MLEKO ENFAMIL PREMIUM MFGM 2, 800g

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt, jeśli jednak nie karmisz piersią lub jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania jako uzupełnienie karmienia piersią, Enfamil Premium MFGM 2 zapewnia kompletne i zbilansowane żywienie dla Twojego dziecka.*

Enfamil Premium MFGM 2 zawiera mieszankę składników odżywczych, które wspomagają wzrost i rozwój Twojego dziecka po 6 miesiącu jego życia.

Składniki

Syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), laktoza (z mleka), odtłuszczone mleko, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, sole wapniowe kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, emulgator (lecytyny (soja)), oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (*Mortierella alpina*), wodorotlenek potasu, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (*Schizochytrium* sp.), sole magnezowe kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, chlorek choline, chlorek potasu, L-askorbinian sodu, L-tyrozyna, siarczan żelaza (II), tauryna, L-tryptofan, inozytol, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, nikotynamid, D-pantotenyj wapnia, siarczan miedzi (II), palmitynian retinyli, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, siarczan manganu, jodek sodu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), selenian (IV) sodu, cholekalcyferol, D-biotyna, fitomenadion, cyjanokobalamina.

100 ml roztworu zawiera:

- wartość energetyczna: 282 kJ/ 68 kcal;
- tłuszcz 3,2 g w tym: kwasy tłuszczowe nasycone 1,26 g; kwas linolowy 0,53 g; kwas alfa-linolenowy 42 mg; kwas arachidonowy (ARA) 20 mg; kwas dokozaheksaenowy (DHA) 15,7 g; węglowodany 7,98 g w tym: cukry 4,6 g; błonnik 0,42 g; polidekstroza 0,21 g; galaktooligosacharydy (GOS) 0,21 g; białko 1,42 g;

- witaminy: witamina A (RE) 56 µg; witamina D 1,7 µg; witamina E (alfa-TE) 0,55 mg; witamina K 2 µg; witamina C 8,2 mg; tiamina 0,044 mg; ryboflawina 0,061 mg; niacyna 0,75 mg; witamina B6 0,06 mg; kwas foliowy 13,2 µg; witamina B12 0,15 µg; biotyna 1,36 µg; kwas pantotenowy 0,46 mg;
- sód 20 mg; potas 90 mg; chlorki 50 mg; wapń 78 mg; fosfor 46 mg, magnez 8,2 mg; żelazo 1,1 mg; cynk 0,53 mg; miedź 0,048 mg; mangan 0,0115 mg; selen 2,6 µg; jod 14,3 µg;
- cholina 17,4 mg; inozytol 4 mg; tauryna 4 mg.

Enfamil Premium MFGM 2 zawiera:

- witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
- kwas ALA (α-linolenowy) ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych¹.
- cynk niezbędny dla prawidłowego wzrostu.
- kwas DHA (szczególny rodzaj kwasów Omega 3), na poziomie, który wspomaga prawidłowy rozwój wzroku Twojego dziecka².
- witaminę D niezbędną dla prawidłowego rozwoju mocnych kości.
- żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych i wspomaga układ odpornościowy.

* Podobnie jak inne mleka następne. Cechy produktu wynikają z funkcji zawartych w nim składników.

¹ Zalecane spożycie kwasu α-linolenowego to 2 g dziennie, a linolowego 10 g dziennie.

² Przy dziennym spożyciu 100 mg DHA, którego zapotrzebowanie pokrywa Enfamil Premium MFGM 2 jako część urozmaiconej diety.

Zastosowanie

Mleko następne dla niemowląt po 6 miesiącu życia.

Zalecane spożycie

- Należy kierować się poniższymi wskazówkami o ile lekarz nie zaleci inaczej.
- Wiek 6-8 miesięcy: liczba porcji /24 h - 3, woda (ml) 210 + ilość miarek* 7, średnia objętość porcji (ml) 230.
- Wiek >8 miesięcy: liczba porcji /24 h - 2-3, woda (ml) 210 + ilość miarek* 7, średnia objętość porcji (ml) 230.

*Odmierzaj proszek wyłącznie za pomocą miarki dołączonej do opakowania. Przechowuj suchą miarkę w puszcze. Jedna płaska miarka (4,6 g) na każde 30 ml wody. Nie ugniataj proszku w miarce. Nadmiar proszku usuń z miarki tępą stroną czystego i suchego noża.

Sposób użycia

- Przed rozpoczęciem przygotowywania pokarmu dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Umyj i wygotuj w wodzie butelki, smoczki, nakrętki i naczynia (przez co najmniej 5 minut we wrzącej wodzie).
- Przed dodaniem proszku gotuj świeżą wodę przez co najmniej 5 minut, a następnie pozostaw aż ostygnie do temperatury pokojowej. Wlej wskazaną ilość ostudzonej wody do butelki.
- Do wody dodaj proszek (zobacz tabelę karmienia).
- Zakręć butelkę. Dokładnie wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym, a następnie wstrząsając do całkowitego rozpuszczenia proszku. Sprawdź temperaturę wytrząsając kilka kropel na swój nadgarstek - preparat powinien być letni.
- Proszek po rozpuszczeniu w wodzie szybko się psuje. Mieszanekę należy podać zaraz po przygotowaniu. Po upływie godziny od rozpoczęcia karmienia, pozostałą w butelce mieszanekę należy wylać, a przybory i naczynia umyć. Nie zamrażać przygotowanej mieszanki.

Ważne wskazówki

- Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt.
- Enfamil Premium MFGM 2 jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i nie powinien być podawany jako substytut mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka.
- Enfamil Premium MFGM 2 jest ważnym elementem coraz bardziej urozmaiconej diety i może stanowić podstawę żywienia podczas wprowadzania produktów uzupełniających do diety Twojego dziecka, zgodnie z zaleceniem lekarza.
- Właściwa higiena, przygotowanie, rozcieńczanie, podawanie i przechowywanie są ważne przy stosowaniu mieszanki.
- Nie podgrzewać pokarmu w kuchence mikrofalowej, gdyż może to doprowadzić do poważnych poparzeń. Świeżo przygotowaną mieszanekę można podgrzać w butelce, w specjalnie do tego przygotowanym podgrzewaczu lub łaźni wodnej.
- Mieszanki w proszku przeznaczone dla niemowląt nie są jałowe i nie powinny być stosowane u wcześniaków i dzieci z zaburzeniami odporności, chyba że na polecenie i pod ścisłym nadzorem lekarza pediatry.
- Należy zawsze skontaktować się ze swoim lekarzem pediatrą w celu wybrania właściwej mieszanki dla Twojego dziecka.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może wyrządzić ogromną szkodę Twojemu dziecku.

